41962/P

Dr. J. Muller Haene
1900

MK

347909

HISTORIA
PARTVS NANAE,
VERSIONIS NEGOTIO
A FOETV VIVO
FELICITER LIBERATAE.

IN

CONSESSV ARTIS OBSTETRICIAE AMANTIVM
PRAELECTA

D. 18. FEBR. 1797

A

F. B. OSIANDER
MED. DR. SCIENT. MED. ET OBST. PROFESSORE ORD.
SOCIETATIS ART. OBST. AMANT. PRAESIDE &c.

GOTTINGAE
TYPIS ROSENBVSCHII
1797.

„Membra per anguſtam neſcit producere partus,
Matre dolente, viam; flexos obliquior artus
Objicit, obvertit — liventia brachia pubi.
— Deus at naſcentibus aſſidet ipſe,
Divinoque juvat perituros numine foetus."

HEBENSTREIT.

WELLCOME LIBRARY INSTITUTE

Nana innupta, annum agens ſeptimum et vigeſimum, quadraginta ~~novem~~ otto pollices Pariſienſes vix alta, ſana, carnoſa, obeſa, ſubfuſca, exceptis oſſibus femoris curvis et pelvi nimium inclinata, caeterum recte formata, anno aetatis decimo octavo prima vice et ab eo tempore quovis menſe per quinque dies rite menſtruata medio anni praeteriti Junio in utero concepit. Poſt

conceptionem menſtruus fluxus emanſit, primisque graviditatis menſibus ſaepius nauſea oborta eſt.

Initio menſis Novembris prima vice motum foetus gravida ſenſit, et lac ſeroſum e mammis identidem effluxit. Sub initium Decemb. a me rogavit, ut in Xenodochium obſtetricium reciperetur.

Solita exploratione inſtituta praeter jam memoratas rationes in diarium Xenodochii inſertae ſunt ſequentes: "Mammae rotundae, magnae, graves, obeſae, areae fuſcae, papillae ejusdem coloris prominentes, globoſae. Venter valde expanſus, usque ad ſcrobiculum cordis fere altus, umbilici foſſam amiſit. Genitalia externa prominentia, retror-

trorſum verſa; Orificium uteri externum altum, rotundum, glabrum, non cicatricatum, clauſum; Cervix uteri nondum conſumta; In fundo vaginae de foetu nil praeſens ſentiri, neque etiam oſſis ſacri promontorium, duobus digitis in vaginam immiſſis, ſtante gravida facile tangi poteſt."

Die ſexta Februarii 1797 in Xenodochium obſtetricium recepta mulier et tertia die ob inclinationem et coarctationem pelvis nimiam praeſentibus ſcientiae obſtetriciae auditoribus ſtudioſe explorata eſt.

Inclinatio ſuperioris aperturae pelvis verſus horizontem cliſeometro a me invento tentata 70 gradus complevit. In ſitu pelvis naturali idem inſtrumentum circa 26 gradus indicat.

Pelvis cavum pelvimetro Steiniano exploratum in media apertura nullam anguſtiam prodidit; in ſuperiori vero apertura, exploratione quatuor digitis inſtituta, conjugatae ſpatium tres pollices Lutetienſes vix transgrediens aeſtimatum eſt.

Circumferentia ventris gravidi in umbilici regione 36 et $\frac{3}{4}$ pollices habuit.

Altitudo ventris ab oſſium pubis criſta ad ſcrobiculum cordis usque 18 pollicum fuit.

Supra pubis regionem tumor, ut videbatur, adipoſus.

Die 10, 11 et 13 menſis Februarii gravida in balneo Xenodochii calido per dimi-

diam

diam horam ſedit, poſtea in lecto cum euphoria ſudavit.

Die 14 Feb. ad veſperae horam ſextam inter tuſſim ſubito liquor amnius e genitalibus emanare coepit, tantaque quantitate omnis defluxit, ut circa duodecim librae liquoris albidi, ſero lactis ſimilis, vaſis exciperentur.

Poſt liquoris effluxum ambitus ventris in umbilici regione 34 pollices adhuc aequavit.

Orificium uteri externum digiti indicis apicem vix admiſit; cervix anguſta et orificium uteri internum, ab externo tres lineas fere remotum, ne digiti quidem apicem plane excepit.

Inferius uteri ſegmentum conicum extremitatis cujusdam juncturam, cubitum nempe vel genu, continere viſum eſt.

Usque ad mediam noctem quieta in lecto jacuit, identidem modo a contractionibus uteri, quas ad partum dolores vocant, vellicata.

Circa horam mediae noctis primam diei 15 Febr. dolores increſcentes parturientem vehementer excruciarunt.

Orificium uteri externum internumque 2 digitos latum cubiti praeſentis tactum admiſit. Cervix uteri evanuit.

Ho-

Horâ matutinâ tertiâ orificium uteri ſufficienter dilatatum auxilium artificiale nunc fieri poſſe, hujusque terminum jam jam eſſe admonuit.

Quare nunc Auditores convocati ſunt, omnisque ad partum difficilem neceſſarius inſtrumentorum et medicamentorum apparatus adornatus eſt.

Situ ad verſionem neceſſario et commodo in menſa parato, et parturiente impoſita circa horae quadrantem ante quintam horam matutinam adgreſſus ſum operationem.

Immiſſa manu ſiniſtra ſitum infantis ſtudioſe explorans brachii dextri cubitum pedemque dextrum intra orificium uteri praeſentes, et juxta illas partes funiculum umbilicalem ſenſi; dorſum infantis in ſiniſtro, caput alte in dextro latere, placentam denique dextrorſum retrorſumque.

Remoto brachio ſupra pedem, educta manus ſiniſtra, licet ultra internum uteri orificium vix immiſſa eſſet, moeconio conſpurcata fuit. Dextra manu illata pedes eduxi, dextrum primo, dein ſiniſtrum. Corpus aeque ac caput cum labore quidem, neque vero nociva difficultate, neque aliis auxiliis, quam manibus, intra breve tempus in lucem ſunt prolata.

Foetus apparenter mortuus vitae ſigna ſtatim non dedit. Perſciſſo et ligato umbilico in calidum balneum translatus pulſum in corde et vaſis umbilicalibus arterioſis monſtravit, et multo quidem labore, frictione nimirum capitis et pedum, inſpiratione in os, manipulatione thoracis, ſpirituoſis et volatilibus ad nares admiſſis, liquore anodyno ad oris labia adfricato, et cum aqua diluto in anum injecto tandem in vitam rediit, ita ut poſt horam, aqua fervida ex improviſo adſperſà, clara voce dolorem exprimeret.

Uterus a foetu liberatus vix ſeſe contraxit; neque vero relaxatus, atonicus, ſed

du-

durus gemelli in illo reliqui ſpeciem habuit.

Immiſſa autem manu nil niſi ſecundinas inveni, quas levi tractione ſine omni haemorrhagia extraxi. Exoneratus uterus per plures minutas, campanae ad inſtar ſpaſtice expanſus, durus et laevis permanſit et modice ſanguinem fudit. Frictione tandem et injectionibus frigidis atque aluminoſis ad contractionem redactus in juſtos rediit fines.

Puellae quatuor fere hebdomades praemature natae pondus 5 et $\frac{1}{2}$ librae civiles, longitudo 17 pollices erant.

Dia-

Diametrus capitis minor 3″ et 1‴; major 4″ et 2‴; humerorum latitudo 4″.

Secundinarum pondus erat 1 libra et 18 ſemunciae. Placentae latitudo ſecundum omnes diametros 7″.

Longitudo totius funiculi umbilicalis 20″; Inſertio illius plane marginalis.

Infans cum puerpera pumilione bene ſe habet.

Edocemur enarratà partus hiſtorià:

1. Nanae partum, licet pelvis foetusque ſitus peſſimus ſit, via naturali artificio-

ſe quidem et laborioſe, neque vero pericu-loſe, finiri poſſe.

2. Exploratio pelvis tota manu vel qua-tuor digitis inſtituta de vera cavitatis am-plitudine certiores nos reddit, quam omnis alia mere inſtrumentorum ope inſtituta di-menſio.

3. In omni caſu, ubi anguſta pelvis triſtiſſimas artis operationes, ſectionem nem-pe uterinam ſ. caeſaream, vel ſymphyſeos pubis, vel foetus diſſectionem, vel capitis perforationem minatur, praematurus partus magis optandus eſt, quam pertimeſcendus; is vero, in quo ſervandi foetus multa ſpes eſt, initio nempe ultimi graviditatis menſe,

4.

4. Situs foetus perverſi cauſa hoc in caſu nulla alia eſſe potuit, quam malus pelvis ſitus, liquoris amnii enormis quantitas, et hujus repentinus effluxus tuſſi vehementi excitatus.

5. Expanſio uteri ſpaſtica ab expanſione atonica duritie uteri et levi haemorrhagià diſtinguitur. Oritur illa a repentina exoneratione poſt enormem expanſionem per liquoris amnii abundantiam vel gemellorum nimio ambitu; et minus anceps eſt, quam atonica.

6. De reſtituenda foetus apparenter mortui vita nunquam deſperandum eſt. Miraculis quidem noſtro tempore mortui in vi-

tam

tam non amplius redeunt; labore autem indefeſſo et prudenti ſaepius.

Levis gravidae pumilionis foetusque ſitus adumbratio ad illuſtrandam hiſtoriam adjecta eſt.

WELLCOME LIBRARY INSTITUTE